

Sự thật về Chấy Đầu

Chấy là nguyên nhân gây ra nhiều bổi rối và hiểu lầm, nghỉ học/SACC và nghỉ làm việc nhiều ngày không cần thiết, và hàng triệu đô la chi cho các biện pháp khắc phục. Bởi vì không có quá trình bệnh có liên quan đến chấy đầu, trường học/SACC không nên loại trừ học sinh khi trứng chấy vẫn còn sau khi điều trị chấy phù hợp, mặc dù theo dõi tiếp tục cho các dấu hiệu tái nhiễm là phù hợp.

- I. Chấy hút máu người nhiều lần trong ngày và sống gần da đầu của người.
- II. Chúng không lây bệnh tật, và do đó, không được coi là một mối nguy hiểm cho sức khỏe.
- III. Chấy rận bò để di chuyển; chúng không thể nhảy hoặc bay.
- IV. Lây truyền trong hầu hết các trường hợp là tiếp xúc trực tiếp giữa đầu với đầu.
- V. Tiếp xúc với quần áo (như nón, khăn quàng cổ, áo khoác) hoặc các vật dụng cá nhân khác (lược, bàn chải, hoặc khăn tắm) không phải là lý do phổ biến cho việc lây lan chấy đầu.
- VI. Vệ sinh cá nhân hoặc sự sạch sẽ ở nhà hoặc trường học/SACC không có gì liên quan gì đến việc lây truyền chấy đầu.
- VII. Chấy không có khả năng di chuyển đến một chủ thể khác trong vài ngày đầu tiên sau khi nở và chúng không tái sinh trong mười ngày đầu.
- VIII. Trứng chấy có thể tồn tại sau khi điều trị thành công.
- IX. Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán chấy là tìm được chấy sống, không phải là trứng chấy, vì các nghiên cứu cho thấy chỉ 18 phần trăm trứng chấy tiếp tục nở.

Những Sự Thật về Vòng Đời của Chấy Đầu

I. Vòng Đời của một Con Chấy

Vòng đời của một con chấy có ba giai đoạn:

- A. Trứng;
- B. Nhộng; và
- C. Người lớn

II Trứng/Trứng chấy

- A. Trứng chấy là trứng chấy ở trên đầu. Rất khó thấy chúng và thường bị nhầm lẫn với gàu hoặc giọt xịt tóc.
- B. Trứng chấy dài khoảng 1mm, có hình dạng như một giọt nước mắt, và có thể đổi sắc tố để phù hợp với màu tóc chủ thể.
- C. Trứng chấy nằm gần hơn với da đầu có khả năng sống sót hơn vì nhiệt độ cơ thể là rất quan trọng để nở.
- D. Trứng chấy mất khoảng một tuần để nở (từ sáu đến chín ngày). Trứng có khả năng sống sót thường nằm cách da đầu khoảng 6mm (1/4 inch).

III. Nhộng

- A. Trứng nở để cho ra một con nhộng.
- B. Vỏ trứng chấy sau đó có màu vàng xỉn hơn có thể nhìn thấy và vẫn bám theo sợi tóc.
- C. Các con nhộng có kích thước gần giống như đầu kim. Sau khi ăn, nó có thể có màu đỏ (màu của máu).
- D. Nhộng nở sau ba tháng và trưởng thành khoảng bảy ngày sau khi nở.

IV. Trưởng thành

- A. Chấy trưởng thành có kích thước khoảng hạt vừng, có sáu chân (mỗi chân có móng vuốt), và có màu từ nâu vàng đến màu xám trắng. Ở những người có tóc màu sẫm, chấy trưởng thành sẽ có màu sẫm hơn.
- B. Con cái thường lớn hơn con đực và có thể đẻ lên đến 6-10 trứng mỗi ngày.
- C. Tuổi thọ của chấy lên đến 30 ngày trên đầu của người. Để sống, chấy trưởng thành cần phải hút máu nhiều lần mỗi ngày. Nếu không hút máu, chấy sẽ chết trong vòng một đến hai ngày.