

Quy Định 758-1  
CÁC HỌC SINH  
Ngày 24 tháng Tám năm 2016

## CÁC HỌC SINH

### Khẩn cấp

- I. Thông tin khẩn cấp phải được cất giữ tại mỗi trường/Chương trình Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi học (SACC) cho mỗi học sinh.
- II. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải được liên lạc càng sớm càng tốt có thể trong những trường hợp khẩn cấp. Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm cung cấp cho trường/SACC thông tin liên lạc đúng và hiện tại để sử dụng cho khẩn cấp.
- III. Nếu viên hiệu trưởng trường, y tá trường, người đại diện, hoặc nhân viên CCC tin rằng chấn thương hoặc bệnh trạng cần sự chăm sóc ngay lập tức, và phụ huynh hoặc người giám hộ không có mặt để chăm sóc cho em trẻ, Dịch vụ Y tế Khẩn cấp 911 sẽ được gọi nếu cần thiết.
- IV. Những học sinh có mặt với một số vấn đề y tế hoặc khẩn cấp thể chất phải bị loại trừ ra từ trường/SACC cho phúc lợi sức khỏe và an toàn của học sinh và dân số học sinh còn lại (xem Phụ lục I).

Viên Phó Tổng Giám đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách Nhiệm Giải trình (hoặc người được uỷ nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Viên Phụ tá Tổng Giám Đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2019.

Tiêu Chuẩn Loại trừ Bệnh hoặc Thương tích

Các lý do mà trường/SACC gửi em trẻ về nhà hoặc cho phụ huynh giữ em ở nhà khỏi đến trường/ SACC.

1. Sốt từ 100°F trở lên - loại trừ cho đến khi học sinh không sốt trong khoảng thời gian ít nhất là 24 tiếng đồng hồ.
2. Viêm màng kết (mắt hồng), nhiễm khuẩn cầu chuỗi, bệnh nấm da, và chốc lở tất cả là nhiễm trùng và phải được điều trị bằng thuốc ít nhất 24 giờ trước khi trở lại trường học. Xin vui lòng không cho phép học sinh bị ảnh hưởng trở lại trước thời gian này để các học sinh khác không bị nhiễm bệnh một cách không cần thiết.
3. Phát ban có nguồn gốc không rõ (đặc biệt nếu kèm theo sốt).
4. Chấn thương đầu.
5. Ho nặng hoặc khó thở.
6. Cảm lạnh - một em trẻ bị chảy máu mũi đặc hoặc liên tục nên ở nhà.
7. Tiêu chảy hoặc nôn mửa - trừ khi cho đến lúc học sinh không có triệu chứng ít nhất 24 giờ.
8. Cổ bị cứng đờ có liên quan đến một cơn sốt và/hoặc có một thương tích gần đây.
9. Không có chích ngừa đầy đủ với bệnh dịch đã biết ở trường.
10. Tham khảo "Bảng Tham Khảo cho Nhân viên Trường về Bệnh Truyền Nhiễm" của VDOH để biết các loại trừ/thông tin khác.