

Cuando ir a la escuela o cuándo quedarse en casa: Guía sobre las enfermedades de los estudiantes

Enfermedad/Síntoma	Quedarse en casa/devuelto a casa de la escuela	Regreso a la escuela
Fiebre*	Temperatura de 38 °C (100.4 °F) o superior	Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para - reducir la fiebre
Síntomas del resfriado: Tos, secreción nasal, dolor de garganta	Síntomas de resfriado acompañados de fiebre o demasiado enfermo para participar en las actividades habituales	No tiene fiebre**, se encuentra bien como para participar en actividades normales y/o ha recibido el visto bueno de un médico
Enfermedad de manos, pies y boca	Llagas en la boca y/o erupciones cutáneas en la palma de las manos y/o las plantas de los pies acompañadas de fiebre* sin diagnóstico médico	No tiene fiebre**, se encuentra bien como para participar en actividades normales y/o ha recibido el visto bueno de un médico. Ampollas deben estar secas y sin secreciones
Piojos	Incapaz de participar en las actividades habituales debido a una picazón intensa	Se ha iniciado el tratamiento adecuado
Impétigo	Lesiones o ampollas sin diagnóstico médico	Sin fiebre** y tras 12 horas de tratamiento antibiótico adecuado. Todas las llagas en la piel expuesta deben estar cubiertas
Conjuntivitis	Coloración rosada o roja del ojo con hinchazón de los párpados y/o secreción ocular sin que exista un diagnóstico médico	No presenta síntomas o un médico le ha dado el visto bueno para volver
Tiña	Piel con picazón, enrojecida, escamosa o agrietada, o erupción en forma de anillo sin un diagnóstico médico	Se ha iniciado el tratamiento adecuado. Todas las llagas en la piel expuesta deben estar cubiertas
Erupción cutánea	Una erupción con ampollas que supuran, duelen, parecen hematomas, aparecen de repente o se extienden rápidamente, y/o si aparece fiebre*	La erupción se ha curado y/o el médico ha autorizado su retorno a la escuela
Garganta infectada por estreptococos	Dolor de garganta o dificultad para tragar con fiebre*	Sin fiebre** y tras 12 horas de tratamiento antibiótico adecuado.
Malestar estomacal: Dolor abdominal, diarrea, vómitos	Dolor abdominal que continúa durante más de 2 horas junto con fiebre* u otros síntomas preocupantes, tiene más de tres deposiciones líquidas acuosas sueltas al día y/o aumento repentino de la frecuencia, ha vomitado 2 o más veces en las últimas 24 horas	Sin síntomas durante 24 horas, si se determina que la causa es una enfermedad no contagiosa/no infecciosa diagnosticada, y/o si la frecuencia de las deposiciones no es más de dos veces superior a la normal y sin accidentes fecales

*Fiebre: temperatura igual o superior a 38°C (100.4°F)

** Sin fiebre: temperatura inferior a 100.4°F (38°C) durante 24 horas sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre como Tylenol, Ibuprofeno.

Si tiene más preguntas sobre la ausencia de un alumno por enfermedad, póngase en contacto con la enfermera de la escuela.